WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM



Internationales Buro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C11D 1/28, 1/10, 1/34, A61K 7/50

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 97/40124

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

30. Oktober 1997 (30.10.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/01298

A1

DE

(22) Internationales Anmeldedatum: 14. März 1997 (14.03.97) (81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

196 16 096.0

23. April 1996 (23.04.96)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US); HÜLS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; DPA-US): Patentwesen/PB 15, D-45764 Marl (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KWETKAT, Klaus [DE/DE]; Münsterstrasse 9, D-44534 Lünen (DE). BROCK, Michael [DE/DE]; Ahornstrasse 18, D-46514 Schermbeck (DE). KOCH, Herbert [DE/DE]; Hindemithstrasse 4, D-46282 Dorsten (DE).

(54) Title: USE OF ANIONIC GEMINI TENSIDES IN FORMULATIONS FOR WASHING, CLEANING AND BODY CARE AGENTS

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON ANIONISCHEN GEMINITENSIDEN IN FORMULIERUNGEN FÜR WASCH-, REINIGUNGS- UND KÖRPERPFLEGEMITTEL

(57) Abstract

The present invention relates to the use of anionic gemini tensides of the formula (I), in which R¹ and R³ are, mutually independently, a hydrocarbon radical with 1 to 22 carbon atoms, R2 is a spacer containing 0 to 100 alkoxy groups, and X and Y, mutually independently, are functional groups and the degree of substitution z = 1 to 10, in washing, cleaning and body care agents in which the proportion of said tensides amounts to at least 0.1 %.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Verwendung von anionischen Geminitensiden gemäß der Formel (I), wobei R¹ und R³ unabhängig voneinander je für einen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen und R² für einen Spacer, der 0 bis 100 Alkoxygruppen enthält, stehen und X und Y unabhängig voneinander funktionelle Gruppen bedeuten und der **(1)**

Substitutionsgrad z = 1 bis 10 beträgt, in Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln, in denen sie zu wenigstens 0,1 % enthalten sind.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanica	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Amenica	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakci
AT	Osterreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ.	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	· MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	MIN.	Republik Mazedonien	TR	Türkei
		_		ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BG	Bulgarien	HU	Ungarn			UA	Ukraine
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei		
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UC	Uganda
BY	Belanus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigle Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KB	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachsten	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	ш	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dånemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG'	Singapur		

WO 97/40124 PCT/EP97/01298

<u>Verwendung von anionischen Geminitensiden in Formulierungen für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel</u>

Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von anionischen Geminitensiden, gemäß der Formel (I) in Formulierungen für das Waschen und Reinigen von Textilien, das Reinigen von harten Oberflächen und das Reinigen und Waschen von Haut und Haar.

Die Zusammenstellung von Formulierungen für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel ist eine komplexe Aufgabe, da die Formulierungen in der Lage
sein müssen, Verschmutzungen der verschiedensten Art von sehr unterschiedlichen Oberflächen zu entfernen. Besonders die schnelle und effiziente
Entfernung von fettigen oder öligen Anschmutzungen ist im allgemeinen
problematisch. Neben den ausschließlich reinigungstechnischen Anforderungen werden die ökotoxikologischen Anforderungen an Formulierungen für
Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel immer stringenter.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen gehört jedoch nicht allein die Verwendung von Tensiden auf Basis nachwachsender Rohstoffe, sondern ganz besonders auch die Herstellung von bei gleichbleibendem Rohstoffeinsatz immer wirksameren Formulierungen, die trotzdem den Anforderungen an ihre biologische Abbaubarkeit und Hautmildheit genügen. Darüber hinaus müssen die immer kompakter werdenden tensidhaltigen Formulierungen für Wasch- und Reinigungsmittel auch bei ebenfalls aus ökologischen Gründen sinkender Wassermenge in der Waschflotte schnell in Wasser löslich sein.

20

25

30

35

All diese Anforderungen lassen sich nicht mehr allein auf physikalischem Wege erfüllen, sondern erfordern den Einsatz leistungsfähigerer Tenside. Die als "New Generation of Surfactants" bezeichneten Gemini- oder auch Zwillingstenside (M. J. Rosen, Chemtech, No. 3 (1995) 30) sind, sofern ihre Struktur optimal gewählt ist, Tenside mit einer deutlich höheren Leistungsfähigkeit als ihre konventionellen Äquivalente und bieten darüber hinaus, bei der Wahl der richtigen Strukturvariante, eine hohe Multifunktionalität und helfen somit, die Wasch- bzw. Reinigungsleistung pro Masseneinheit der Formulierung zu steigern.

Bei den in den Anmeldungen WO 95/19953 und WO 95/19955 beschriebenen Geminipolyhydroxyfettsäure- und Geminipolyetherfettsäureamiden handelt es sich um nichtionische Geminitenside. Im Vergleich zu den heute bekannten nichtionischen Tensiden bieten diese Verbindungen jedoch keine besondere Steigerung der Effizienz pro Einsatzmasse. Auch kann die Multifunktionalität dieser Verbindungen nur durch eine deutliche Steigerung der Molekülmasse erzielt werden, was hinsichtlich der Schonung des Ökosystems als eher kontraproduktiv betrachtet werden muß.

Werden jedoch anionische Geminitenside, wie sie in DE-A 44 40 328 beschrieben sind (Formel I), eingesetzt, kommt man zu einer signifikanten Effizienzsteigerung gesamter Endformulierungen. Das ist möglich, weil die anionischen Geminitenside deutlich effizienter als konventionelle anionische Tenside hinsichtlich beispielsweise der kritischen Mizellbildungskonzentration, Grenzflächenspannung, Wasserlöslichkeit, Härtestabilität, lösungsvermittelnder Wirkung und Waschkraft und darüber hinaus aufgrund ihrer besonderen Struktur besonders hautmild und biologisch abbaubar sind.

Formel (I):

20

25

30

5

10

15

$$O = \begin{pmatrix} R^1 \\ N-X \\ R^2 \\ O = \begin{pmatrix} N-Y \\ N-Y \end{pmatrix} \\ O = \begin{pmatrix} R^3 \\ R^3 \\ \end{pmatrix}$$

Gegenstand der Erfindung ist daher die Verwendung von mindestens 0, 1 % anionischen Geminitensiden gemäß der Formel (I), in Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln, wobei R^1 und R^3 unabhängig voneinander je für einen unverzweigten oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 22, vorzugsweise 7 bis 17 Kohlenstoffatomen, und R^2 für einen Spacer aus einer unverzweigten oder verzweigten Kette mit 2 bis 100 Kohlenstoffatomen, die 0 bis 20 Sauerstoff-, 0 bis 20 Stickstoff-, 0 bis 4 Schwefel-

und/oder 0 bis 3 Phosphoratome enthält und die 0 bis 20 funktionelle Seitengruppen, wie z. B. Hydroxyl-, Carbonyl-, Carboxyl-, Amino- und/oder Acylaminogruppen, aufweist und der 0 bis 100, vorzugsweise 0 bis 20, Alkoxygruppen enthält, steht, X und Y unabhängig voneinander funktionelle Gruppen bedeuten und der Substitutionsgrad z=1 bis 10 beträgt. Eine ausführliche Beschreibung verschiedener Ausführungen des Spacers ist in

30

35

der Deutschen Patentanmeldung 44 40 328 enthalten, die wir hiermit als Referenz anführen.

X oder Y steht für einen Substituenten der Formel II $^{-({\rm C_2H_40})}_{\alpha}({\rm C_3H_60)}_{\beta}{\rm H}$ = $\overline{0}$ bis 50, vorzugsweise α = 10 bis 30, mit α = 0 bis 60, vorzugsweise β = 20 bis 40, und α + β = 1 bis 100, vorzugsweise α + β = 10 bis 50, wobei R^2 nicht C_2H_4 ist, wenn $\beta = 0$ ist, und X und Y für einen Substituenten der Formel III 10 oder X oder Y stehen unabhängig voneinander für Substituenten der Formel $-(c_2H_40)_{\gamma}(c_3H_60)_{\delta}$ -FR mit jeweils γ = 0 bis 20, vorzugsweise γ = 0 bis 8, 15 = 0 bis 20, vorzugsweise δ = 0 bis 12, und γ + δ = 1 bis 40, vorzugsweise γ + δ = 5 bis 20, wobei die Alkoxideinheiten statistisch oder blockweise eingebunden sind und die Reihenfolge beliebig ist, und wobei FR für einen funktionellen Rest - CH_2 -COOM, - SO_3 M, -P(0)(OM)₂, $-c_2H_4-so_3M$ oder $-0-c(0)-c_2H_3(so_3M)-co_2M'$ 20

mit M, M' = Alkali-, Ammonium-, Alkanolammonium- oder ½ Erdalkaliion steht.

Der Alkoxylierungsgrad ist jeweils ein Mittelwert und kann jeden beliebigen, auch nicht ganzzahligen Wert in den angegebenen Grenzen annehmen.

Neben mindestens 0,1 % anionischem Geminitensid gemäß der Formel (I), das als Mischung verschiedener Homologen der gleichen Grundstruktur (sowohl hinsichtlich der C-Kettenlänge der lipophilen Ketten als auch des Spacers oder der Alkoxyetherketten) und Mischung von Verbindungen mit verschiedenem Funktionalisierungsgrad, zum Beispiel Sulfierungsgrad zwischen 1 und 2, vorliegen kann, können die erfindungsgemäßen Formulierungen für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemittel noch jeweils wenigstens 0,001, vorzugsweise wenigstens 0,1 % einer oder mehrerer Wasch-, Reinigungs- oder Körperpflegemittelkomponenten, die im folgenden näher erläutert werden, enthalten. Alle Prozentangaben sind als Gewichtsprozente zu verstehen, es sei

denn, die Prozentangabe wird explizit auf eine andere Größe bezogen. Als solche Komponenten sind die folgenden zu nennen:

a) Enzyme: Eine ganze Reihe von Enzymen können in den erfindungsgemäßen Formulierungen enthalten sein, so zum Beispiel Proteasen, Amylasen, Lipasen, Cellulasen und Peroxidasen sowie Mischungen der jeweiligen Enzyme. Auch andere Enzyme können in die Waschmittelformulierungen eingearbeitet werden, wobei sie, wie die vorgenannten, von verschiedenster Herkunft aus Bakterien, Pilzen, z. B. Hefepilzen, und anderen Pflanzen stammen, aber auch tierischen Ursprungs sein können.

10

15

5

Unterschiedliche Faktoren bestimmen die Auswahl einzelner Enzyme, wie beispielsweise die pH-Aktivitäts- und / oder -Stabilitätsoptima, die Thermostabilität, die Stabilität gegenüber verschiedenen Tensiden, Buildern usw. Enzyme werden in Einwaagen bis zu 50 mg, bevorzugt 0,01 mg bis 3 mg aktives Enzym auf ein Gramm Waschmittelformulierung eingesetzt, d. h. 0,001 % bis ca. 5 % in den Waschmittelformulierungen. Für Proteasen gilt eine Einsatzkonzentration einer Aktivität von 0,005 bis 0,1 Anson Einheiten (Anson Units = AU) pro Gramm Formulierung.

20

b) Enzymstabilisatoren: Dazu gehören wasserlösliche Quellen von Calciumoder/und Magnesiumionen, die häufig zugesetzt werden müssen, damit das Buildersystem nicht auch diese Zentralatome der Enzyme entfernt und sie damit desaktiviert. Calciumionen sind hier im allgemeinen effektiver als Magnesiumionen. Zusätzliche Stabilisierung kann durch den Zusatz von Boraten (z.B. Severson, US 4 537 706) erfolgen. Typischerweise enthalten die Formulierungen 1 bis 30, vorzugsweise 2 bis 20, besonders bevorzugt 5 bis 15 und ganz besonders bevorzugt 8 bis 12 Millimole Calciumionen pro Liter Endformulierung.

30

35

25

Obwohl die Konzentration in verschiedenen Formulierungen abhängig von den verwendeten Enzymen variieren kann, sollten immer genug Calciumionen nach der Komplexierung durch das Bui dersystem und durch Seifen verfügbar sein, um die Enzyme aktiviert zu halten. Jedes wasserlösliche Calcium- oder Magnesiumsalz kann verwendet werden. Es seien hier die folgenden Beispiele, ohne die erfindungsgemäßen Formulierungen darauf einzuschränken, erwähnt: Calciumchlorid, -formiat, -sulfat, -hydroxid, -malat, - maleat, -acetat und die entsprechenden Magnesiumsalze. Abhängig von der Menge und Art der

verwendeten Enzyme enthalten die Waschmittelformulierungen 0,05 % bis 2 % wasserlösliche Calcium und / oder Magnesiumsalze.

Boratstabilisatoren sind zu 0,25 % bis 10 %, bevorzugt 0,5 % bis 5 % und besonders bevorzugt 0,75 % bis 3 %, berechnet als Borsäure, in den Formulierungen enthalten. Die zugesetzten Boratstabilisatoren müssen in der Lage sein, Borsäure bilden zu können. Hier ist der direkte Einsatz von Borsäure bevorzugt, doch können auch, ohne darauf einzuschränken, Boroxid, Borax, andere Alkaliborate und substituierte Borsäuren wie z. B. Phenyl-, Butyl-und p-Bromphenylborsäure eingesetzt werden.

10

15

20

25

30

35

5

c) Bleichsysteme - Bleichmittel und Bleichaktivatoren: Für die erfindungsgemäßen Formulierungen ist die Verwendung eines Bleichsystems, sei es Bleichmittel und - aktivator oder lediglich ein Bleichmittel, optional. Sofern verwendet, werden die Bleichmittel in Mengen von 1 bis 30 %, bevorzugt 5 bis 20 %, eingesetzt. Sofern eingesetzt, werden Bleichaktivatoren in Mengen von 0,1 bis 60 % des Bleichmittels verwendet. Bevorzugt werden 0,5 bis 40 % Bleichsystem, bezogen auf die Formulierung. Alle für die Reinigung von Textilien, harten Oberflächen (Industrie- und Haushaltsreiniger, Geschirrspülmittel) oder andere Reinigungsaufgaben geeignete Bleichmittel können eingesetzt werden. Dazu zählen sowohl auf Sauerstoffbasis arbeitende Bleichmittel wie auch andere Systeme. Perborate, z. B. Natriumperborate, sei es als Mono- oder Tetrahydrat, können eingesetzt werden, ebenso wie Percarbonsäure-Bleichmittel und deren Salze. Zu den geeigneten Vertretern dieser Klasse zählen Magnesiumperoxyphthalat-hexahydrat, Magnesium-metachlorperbenzoat, 4-Nonylamino-4-oxoperoxybutansäure, Diperoxydodecandisäure und, besonders bevorzugt, 6-Nonylamino-6-oxoperoxycaprinsäure (Burns et al., US 4 634 551). Persauerstoffbleichmittel können ebenfalls eingesetzt werden. Zu geeigneten Vertretern dieser Klasse zählen Natriumcarbonatperoxohydrat und vergleichbare Percarbonate, Natriumpyrophosphatperoxohydrat, Harnstoffperoxohydrat, Natriumperoxid und Persulfatbleichmittel. Auch Mischungen von Bleichmitteln können in den erfindungsgemäßen Wasch- und Reinigungsmittelformulierungen eingesetzt werden.

Persauerstoffbleichmittel werden bevorzugt mit Bleichaktivatoren kombiniert, zu denen, ohne die erfindungsgemäßen Formulierungen darauf zu beschränken, Nonanoyloxy-phenylsulfonat, Tetraacetylethylendiamin und deren Mischungen sowie andere in US 4 634 551 erwähnte Kombinationen von Bleich-

10

15

20

25

mitteln und -aktivatoren gehören. Ganz besonders bevorzugt als Bleichakti- $R^{1}N(R^{5}C(0)R^{2}C(0)L$ vatoren sind Amidderivate der Formeln $R^{1}C(0)N(R^{5})R^{2}C(0)L$ R^1 wobei eine Alkylgruppe mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen, R^2 eine Alkylengruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, R^5 ein Wasserstoffatom oder Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryl mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen und L jedwede für nucleophile Reaktionen geeignete Abgangsgruppe (z. B. Phenylsulfonat) bedeuten. Als Beispiele seien hier die folgenden Verbindungen erwähnt: (6-Octanamido-caproyl)oxyphenylsulfonat. (6-Nonanamido-caproyl)oxyphenylsulfonat, (6-Decanamidocaproyl)oxyphenylsulfonat und deren Mischungen. Acyllactamaktivatoren gehören zu einer anderen Klasse bevorzugter Bleichaktivatoren, hier Acylcaprolactam und Acylvalerolactam mit Alkyl-, Aryl-, Alkoxyaryl- und Alkylaryl-acylgruppen, die 1 bis 16 Kohlenstoffatome enthalten. Unter den nicht auf Sauerstoff basierenden Bleichmitteln gehören sulfonierte Zinkund/oder Aluminium-phthalocyanine zu den bevorzugten Systemen.

d) Buildersysteme: Ebenfalls optional können die erfindungsgemäßen Wasch-Reinigungsmittel **Buildersysteme** (Gesamtbuilder), wasserenthärtenden Silikaten und sonstigen anorganischen und/oder organischen Buildern bestehen. enthalten. Sie werden Waschmittelformulierungen eingesetzt, um die Partikelschmutzentfernung zu unterstützen und die Wasserhärte zu kontrollieren. Flüssigformulierungen enthalten 0 bis 50 %, bevorzugt 5 bis 50 % und besonders bevorzugt 5 bis 30 % Gesamtbuilder. Granulierte Formulierungen enthalten O bis 80 %, bevorzugt 10 bis 80 % und besonders bevorzugt 15 bis 50 % Gesamtbuilder. Höhere Konzentrationen sollen hier jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Zu den anorganischen Buildern zählen insbesondere Silikate und Alumosilikate.

Beispiele für Silikatbuilder sind Alkalisilikate, besonders solche mit $SiO_2: Na_2O$ im Verhältnis 1,6 : 1 bis 3,2 : 1 und Schichtsilikate wie Natriumsilikate vom Typ $NaMSi_xO_{2x+1}\cdot yH_2O$ (M steht für Na oder H, x=1,9-4, y=0-2O). Besonders bevorzugt ist der mit SKS-6 bezeichnete Typ. Auch Magnesiumsilikate können hier eingesetzt werden. Alumosilikate sind ebenfalls nützlich in den erfindungsgemäßen Formulierungen und besonders wichtig in granularen Waschmittelformulierungen. Die verwendbaren Alumosilikatbuilder können mit der empirischen Formel $[M_z(zAlO_2)_y]xH_2O$

beschrieben werden, z und y nehmen Werte von wenigstens 6 an , das molare Verhältnis von z zu y liegt im Bereich von 1,0 bis 0,5, x nimmt Werte von ca. 0 bis 30 an. Es kann sich sowohl um kristalline als auch um amorphe, synthetische oder natürlich vorkommende Alumosilikate handeln. Die Silikatbuilder können zu 0 bis 60 % enthalten sein.

Zu den anorganischen Buildern zählen weiterhin, ohne die Formulierungen darauf einzuschränken, Alkali-, Ammonium- und Alkanolammoniumsalze von Polyphosphaten (z. B. Tripolyphosphate, Pyrophosphate und polymere Metaphosphate), Phosphonate, Carbonate (auch Bicarbonate und Sesquicarbonate) und Sulfate.

Auch organische Builder gehören zu den verwendbaren Buildern. Dazu gehören Polycarboxylate, wie Ethercarboxylate, (cyclisch oder acyclisch). Hydroxypolycarboxylate, Copolymere aus Maleinsäureanhydrid und Ethylen oder Vinylmethylether, 1,3,5-Trihydroxybenzol-2,4,6-trisulfonsäure und Carboxymethoxybernsteinsäure, die alle in Form der Säure oder ihrer Alkali-, Ammonium- oder Organoammoniumsalze eingesetzt werden können. Alkyl-, Ammonium- oder Organoammoniumsalze der Polyessigsäure sind ebenso geeignet wie Salze der Zitronensäure oder Kombinationen von verschiedenen Buildern. Alkenylbernsteinsäuren und -salze sind besonders bevorzugte organische Builder. Monocarbonsäuresalze können ebenso entweder allein oder in Kombination mit einem der vorgenannten Builder in die Formulierungen eingerarbeitet werden.

25

30

35

5

10

15

20

Die anorganischen (ohne Silikate) und/oder organischen Builder sind zu 0 bis 40 % enthalten.

e) Schmutzlösepolymere: Sämtliche zum Stand der Technik gehörenden Schmutzlösepolymere können als Ingredienzien in den erfindungsgemäßen Formulierungen eingesetzt werden. Als Bestandteil von Formulierungen tragen Schmutzlösepolymere zu einer leichteren Ablösung von Öl- und Fettschmutz bei, insbesondere bei Waschvorgängen und bei der Textilveredelung. Schmutzlösepolymere zeichnen sich dadurch aus, daß sie sowohl hydrophile wie auch hydrophobe Bauelemente besitzen. Die Wirkungsweise von Schmutzlösepolymeren beruht auf einer Modifizierung der Faseroberfläche von Polyester- bzw. Baumwoll/Polyestermischgeweben mit Hilfe des hydrophilierenden Polymers. Dabei bewirkt das hydrophile Segment des Schmutzlösepolymers eine leichtere Benetzung der Oberfläche, während das hydrophobe Segment als Ankergruppe fungiert.

5

10

Der Feuchtigkeitstransport (Wasserabsorption und Saugfähigkeit) wird bei den mit dem Schmutzlösepolymer behandelten hydrophoben Geweben wie Polyester oder Polyester/Baumwollmischgeweben erheblich verbessert. Außerdem verleihen sie den Stoffen antistatische und Gleiteigenschaften, wodurch die Handhabung dieser Fasern beim Schneiden und Nähen (Textilverarbeitung) erleichtert wird. Die Behandlung des Gewebes mit dem Schmutzlösepolymer ist als eine Art Imprägnierung zu verstehen, d.h. das Schmutzlösepolymer verbleibt für mehrere Waschcyclen auf der Faser.

Zur wichtigsten Gruppe von Schmutzlösepolymeren gehören Poly- bzw. Oligoester auf Basis Terephthalsäure/Polyoxyalkylenglykole/monomere Glykole. Schmutzlösepolymere dieser Gruppe werden schon seit mehreren Jahren vermarktet. Zu den wichtigsten Verkaufsprodukten zählen u.a. ZELCON (Du Pont), MILEASE T (ICI), ALKARIL QCF/QCJ (Alkaril Inc.) und REPEL-O-TEX (Rhone-Poulenc). Bevorzugt sind im Rahmen dieser Erfindung Schmutzlösepolymere, die sich durch folgende empirische Summenformel beschreiben lassen:

$(CAP)_x(EG/PG)_y(T)_z(I)_q(DEG)_s(En)_t(CAR)_r$

25

30

35

Dabei repräsentiert (CAP) sog. "capping groups", die das Polymer am Ende verschließen. Der Endgruppenverschluß trägt zur Stabilisierung der Polymeren bei. Dabei steht (CAP) für eine Vielzahl von möglichen Endgruppen. Bevorzugte Endgruppen sind u.a. Sulfo-aroylgruppen, wie z.B. die Sulfobenzoyl-Gruppe, die in Form einer Umesterung mit Sulfobenzoesäurealkylester eingeführt werden kann. Der Einbau von Endgruppen wirkt sich dabei zum einen regulierend auf das Molekulargewicht aus, andererseits führt er zur Stabilisierung der gewonnenen Polymeren. Neben Sulfoaroyl-Gruppen können auch ethoxylierte oder propoxylierte Hydroxyethan- und Hydroxypropansulfonate, so wie sie beispielsweise in WO 95/02029 und WO 95/02030 beschrieben sind, eingesetzt werden.

Bevorzugte Endgruppen sind auch Poly(oxyethylen)monoalkylether, in denen die Alkylgruppe 1 bis 30 C-Atome enthält und bei denen die Polyoxyethylengruppe aus 2-200 Oxyethyleneinheiten besteht. Endgruppen dieser Art werden z.B. in WO 92/17523 und DE 40 01 415 beschrieben. In EP 0 253 567 und EP 0 357 280 werden im besonderen solche endgruppenverschlossenen Polyester (capped polyesters) beschrieben, die zum einen durch nichtionische Gruppen wie z.B. C1-C4-Alkyl, C1-C4-Hydroxylalkyl, C1-C4-Acyl als auch durch ionische Succinatgruppen verschlossen werden. Grundsätzlich sind auch Mischungen verschiedener Endgruppen möglich, wobei x Werte von 0-2 annimmt.

10

15

20

25

5

Die Gruppe (EG/PG) steht für eine Oxyethylenoxy-, Oxypropylenoxy-Gruppe oder Mischungen davon, wobei y Zahlenwerte von O bis 80 annimmt. Als eine Variation der o.g. Polyester wird auch das Einbringen von verzweigten monomeren Glykolbausteinen beschrieben wie 1,2-Butylen- und 3-Methoxy-1,2-Propylenglykolen (EP O 241 985).

Die Gruppe (T) steht u.a. für eine Terephthaloylgruppe, die im Polymer sozusagen als Ankergruppe zwischen Schmutzlösepolymer und Substrat (Faser) fungiert. Bei sämtlichen zum Stand der Technik gehörenden Schmutzlösepolymeren auf Oligo- bzw. Polyesterbasis ist die Gegenwart von Terephthaloyl-Gruppen essentiell für die Performance dieses Additivs. Neben Terephthaloylgruppen können jedoch auch aliphatische Analoga vertreten sein, wie z.B. Adipate, die durch Adipinsäure bzw. Adipinsäurediester eingebaut werden können. In DE 44 03 866 werden z.B. amphiphile Polyester beansprucht, die neben aromatischen auch aliphatische Dicarbonsäuren beinhalten und als Waschmitteladditiv bzw. Schmutzlösepolymer eingesetzt werden. Dabei nimmt z Werte von 1 bis 50 an.

30

35

Jedes (I) steht für eine interne anionische Gruppe mit q = 0-30. Der Einbau von anionischen Gruppen, in erster Linie Sulfoisophthaloyl-Gruppen in das Polymergerüst, stellt sich als sehr vorteilhaft für die Performance des Schmutzlösepolymers heraus. Die Sulfoisophthaloyl-Gruppen stabilisieren das Polymer und inhibieren den Übergang von der gewünschten amorphen Form zur schlechter löslichen kristallinen Form des Polymers. In US 4 427 557 und EP 0 066 944 werden solche anionischen Modifikationen der o.g. Polyester beschrieben, die als eine weitere Polymerisationskomponente das Natriumsalz der Sulfoisophthalsäure beinhalten. Die polymerisierten Polyethylenglykole

15

20

25

(PEG) besitzen Molmassen von 200-1000 und ergeben nach ihrer Polymerisation mit Ethylenglykol und Terephthalsäure Polyester mit Molgewichten von 2 000-10 000.

5 **DEG** steht für eine Di(oxyethylen)oxy -Gruppe mit s = 0 - 80.

Jedes (En) steht für eine Poly(oxyalkylen)oxy-Gruppe, die aus 2 bis 100 Oxyalkylengruppen aufgebaut ist, wobei t = 0-25 ist und die Alkylgruppen 2-6 C-Atome enthalten. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Poly(oxyalkylen)oxy-Gruppen um Poly(oxyethylen)oxy-Gruppen, wobei die Molekulargewichte erheblich variieren können. Neben Poly(oxyethylen)oxy-Gruppen können auch Poly(oxypropylen)oxy-Gruppen vertreten sein sowie alle denkbaren Mischungen. In DE 14 69 403 wird z.B. ein Verfahren zur oberflächenverändernden Behandlung von aus Polyestern abgeleiteten Artikeln beschrieben. Dabei sind die hergestellten Polyester aus ET-Einheiten aufgebaut mit ET:POET=2-6:1, wobei Polyethylenglykole mit Molgewichten von 1000-4000 eingesetzt werden. US 3 959 230 beansprucht ET/POET-Polyester mit ET:POET=25:75-35:65, wobei niedermolekulare Polyethylenglykole mit Molgewichten von 300-700 eingesetzt werden und die gewonnenen Polyester Molgewichte von 25 000-55 000 aufweisen.

Jedes (CAR) steht für eine Carbonylgruppe (C=0) einer Carbonateinheit, wobei r eine Zahl von 0 bis 80 darstellt. Es zeigt sich, daß durch Einbau von Carbonatgruppen in Form von Kohlensäureestern in das Polymergerüst die Performance der Schmutzlösepolymere weiterhin gesteigert werden kann. Einerseits lassen sich Polymere dieses Typs leichter dispergieren, zum anderen ist es möglich, mit Hilfe von Kohlensäureestern fließfähige, pumpbare Polymere zu erhalten, was hinsichtlich der meist üblichen Konfektionierung deutliche Vorteile bringt.

Die durch die obige empirische Summenformel beschriebenen Schmutzlösepolymere auf Poly- bzw. Oligoesterbasis besitzen Molekulargewichte zwischen 200 und 100 000. Bevorzugt sind meist Molekulargewichte im Bereich von 500 bis 25 000.

Neben dieser Klasse von Schmutzlösepolymeren können im Rahmen der Formulierungen auch Cellulose-Derivate eingesetzt werden. Solche Produkte sind kommerziell erhältlich z.B. als Hydroxyether der Cellulose unter der Produktbezeichnung METHOCEL (Dow). Bevorzugt sind Cellulose-Derivate mit CI-C4-Alkyl- und C4-Hydroxyalkylcellulosen (US 4 000 093). Als weitere Gruppe von Schmutzlösepolymeren können auch Poly(vinylester)-Verbindungen eingesetzt werden. Hierbei sind insbesondere Pfropfpolymerisate von Polyvinylacetat und Polyoxyethylenglykol bevorzugt. Produkte dieser Art sind marktgängig wie z.B. SOKALAN HP 22 (BASF).

Soweit Schmutzlösepolymere in den erfindungsgemäßen Formulierungen eingesetzt werden, beträgt der Gehalt 0,01 bis 10,0 Gew.-%. Bevorzugt ist ein Gehalt von 0,1 bis 5 Gew.-% bezogen auf die entsprechende Formulierung.

10

5

f) Chelatbildende Agentien: In den erfindungsgemäßen Formulierungen sind optional auch Eisen- und Manganionen unter Chelatbildung komplexierende Agentien enthalten, die zu der Gruppe der Aminocarboxylate, Aminophosphonate und polyfunktionalisierten Aromaten (z.B. Dihydroxybenzolsulfonsäurederivate) gehören. Auch Mischungen der verschiedenen Chelatisierungs-Agentien sind wirksam. Ein bevorzugtes bioabbaubares chelatbildendes Agenz ist Ethylendiamindisuccinat. Die vorgenannten Agentien werden in Anteilen von 0,1 bis 10 %, besonders bevorzugt von 0,1 bis 3,0 %, der Waschmittelformulierung eingesetzt.

20

25

30

15

g) Komponenten zur Entfernung von Ton- oder Lehmschmutz und Verhinderung der Wiederanschmutzung: Die erfindungsgemäßen Formulierungen können zu diesem Zweck alkoxylierte, bevorzugt ethoxylierte, Amine, unabhängig davon, ob es sich hier um mono-, oligo- oder polymere Amine handelt, enthalten. Für feste Formulierungen liegt die Einsatzmenge bei 0,01 bis 10 %, bei Flüssigformulierungen bei 0,01 bis 5 % der Gesamtformulierung. Andere Gruppen von Verbindungen, die diese Eigenschaften aufweisen, sind kationische Verbindungen (wie in EP-A-O 111 984), zwitterionische Polymere (wie in EP-A-O 112 592) oder Carboxymethylcellulose, die ebenfalls das Schmutztragevermögen einer Waschflottte zu steigern vermögen.

35

h) Polymere Dispersionshilfen (Cobuilder): Diese Additive werden in Mengen von 0,1 bis 7,0 % der erfindungsgemäßen Gesamtformulierung eingesetzt, wobei es sich um Polycarboxylate oder um Polyethylenglykole handelt, die sowohl die Wirkung des eingesetzten Builders verstärken als auch Inkrustierungen und Wiederanschmutzungen verhindern und bei der Ablösung von Parti-

10

25

30

35

kelschmutz eine Rolle spielen. Die hier einsetzbaren Verbindungen werden durch Polymerisation oder Copolymerisation von geeigneten ungesättigten Carbonsäure- oder Carbonsäureanhydridmonomeren erhalten. Hier sind Polyacrylate aber auch Maleinsäureanhydrid/Acrylsäure-Copolymerisate bevorzugt. Die Molekulargewichte der ersteren bewegen sich in einem Bereich von 2 000 bis 10 000, bevorzugt 4 000 bis 7 000 und besonders bevorzugt im Bereich von 4 000 bis 5 000. Geeignete Copolymerisate weisen Molgewichte von 2 000 bis 100 000, bevorzugt 5 000 bis 75 000 und besonders bevorzugt 7 000 bis 65 000 auf. Verwendbare Polyethylenglykole weisen Molgewichte im Bereich 500 bis 100 000, besonders bevorzugt 1 500 bis 10 000 auf. Auch Polyasparagate und- glutamate können zusammen mit Zeolith-Buildern eingesetzt werden, wobei die verwendbaren Polyasparagate mittlere Molgewichte von ca. 10 000 aufweisen.

- i)Optische Aufheller: Alle nach dem Stand der Technik bekannten optischen Aufheller sind in den erfindungsgemäßen Formulierungen einsetzbar. Sie werden zu 0,05 bis 1,2 %, bezogen auf die Gesamtformulierung, eingearbeitet. Einige nicht einschränkende Beispiele für geeignete Verbindungsgruppen seien im folgenden genannt: Stilbenderivate, Pyrazoline, Cumarin,
 Carbonsäuren, Methincyanine, Dibenzothiophen-5,5-dioxid, Azole, 5- und 6-gliedrige Heterocyclen.
 - j) Schauminhibitoren: Je nach genauer Zusammensetzung (d. h. Schäumvermögen der verwendeten Tenside) und Art des Schauminhibitors müssen 0 bis 5 % (bezogen auf Gesamtformulierung) davon eingesetzt werden. Monofettsäuresalze werden in einer Menge von 0 bis zu 5 %, bevorzugt 0,5 bis 3 % eingesetzt, Silicone werden in einer Menge bis zu 2 %, bevorzugt 0,01 bis 1 % und besonders bevorzugt von 0,25 bis 0,5 % eingesetz. Zu den Verbindungen, die in den erfindungsgemäßen Formulierungen als Schauminhibitor eingesetzt werden können, gehören Monofettsäuren und ihre Salze mit C-Kettenlängen von 10 bis 24, bevorzugt 12 bis 18 Kohlenstoffatomen. Auch hochmolekulare nicht oberflächenaktive Verbindungen, wie Paraffine, Fettsäureester (z. B. Triglyceride), aliphatische Ketone, N-alkylierte Aminotriazine oder Di- bis Tetraalkyldiaminchlortriazine, Monostearylphosphate und Monostearylalkoholphosphatester können eingesetzt werden. Auch Mischun-

gen von Siliconen und Silan-modifizierte Silikaten, i. a. mit Polyalkylenglykolen als Lösungsmittel, können als Schauminhibitoren eingesetzt werden.

k) Textilweichmacher: Verschiedene im Waschprozess verwendbare Textilweichmacher können hier verwendet werden, besonders jedoch Smectit-Tone sowie andere weichmachende Tone in Mengen zwischen 0,5 und 10 % (bezogen auf die Gesamtformulierung). Die vorgenannten Weichmacher können in Kombination mit anderen Weichmachern wie Aminen und den verbreiteten kationischen Weichmachern verwendet werden.

10

5

l) Tenside: Neben den anionischen Geminitensiden gemäß der Formel (I) können jeweils Kombinationen oder einzelne der im folgenden genannten Tenside mit den Geminitensiden in den erfindungsgemäßen Formulierungen kombiniert werden. Hierbei werden 0,1 bis 70 % dieser Tenside eingesetzt:

15

20

25

Ohne die Formulierungen darauf einzuschränken, seien als Beispiele für nichtionische grenzflächenaktive Substanzen Fettsäureglyceride, Fettsäurepolyglyceride, Fettsäureester, Alkoxylate von C_6 - C_{30} -Alkoholen, alkoxylierte Fettsäureglyceride, Polyoxyethylenoxypropylenglykolfettsäureester, Polyoxyethylensorbitanfettsäureester, Polyoxyethylen-Rhizinusöl- oder gehärtete Rhizinusölderivate, Polyoxyethylenlanolinderivate, Polyoxyethylenfettsäureamide, Polyoxyethylenalkylamine, Derivate von Alkanolaminen, Derivate von Alkylaminen, Alkylaminoxide, Derivate von Eiweißhydrolysaten, Hydroxymischether, Alkylpolyglycoside und Alkylglucamide (z. B. N-Methylalkylglucamide) sowie nichtionische Geminitenside bzw. verbrückte nichtionische Tenside (wie in WO 95/19951 (Polyhydroxyaminverbindungen), WO 95/19953, WO 95/19954 und WO 95/19955 sowie WO 95/20026 beschrieben) genannt.

30

35

Als Beispiele für anionische grenzflächenaktive Substanzen, die für Kombinationen eingesetzt werden können, seien Seifen, Ethercarbonsäuren und deren Salze, Alkylsulfonate, α -Olefinsulfonate, α -Sulfofettsäurederivate (einschließlich der in W093/25646 beschriebenen), Sulfonate höherer Fettsäureester, höhere Alkoholsulfate (primär und sekundär), Alkoholethersulfate, Hydroxymischethersulfate, Sulfate von alkoxylierten Carbonsäurealkanolamiden, Salze von Phosphatestern, Tauride, Isethionate, lineare Alkyl-

10

15

20

benzolsulfonate, verbrückte Alkylbenzolsulfonate (wie DOWFAX-Typen der Firma Dow), Alkylarylsulfonate, Sulfate der Polyoxyethylenfettsäureamide und Derivate von Acylaminosäuren, Alkylethercarbonsäuren, Alkyl- und Dialkylsulfosuccinate, Alkenylsulfosuccinate, Alkyl- oder Alkenylsarcosinate und sulfatierte Glycerinalkylether genannt.

Als Beispiele für kationische gängige grenzflächenaktive Substanzen, die für Kombinationen eingesetzt werden können, seien Alkyltrimethylammoniumsalze, Dialkyldimethylammoniumsalze, Alkyldimethylbenzylammoniumsalze, Imidazoliniumderivate, Alkylpyridiniumsalze, quaternierte Fettsäureester von Alkanolaminen, Alkylisochinoliniumsalze, Benzethoniumchloride und kationische Acylaminosäurederivate genannt.

Als Beispiele für ampholytische und betainische grenzflächenaktive Substanzen, die für Kombinationen eingesetzt werden können, seien Carbobetaine, wie z. B. Kokosacylamidopropyldimethylbetain, Acylamidopentandiethylbetain, Di-methylammoniohexanoat -acylamidopropan-(oder -ethan-)dimethyl (oder- diethyl-)betain - alle mit C-Kettenlängen zwischen 10 und 18, Sulfobetaine, Imidazolinderivate, Sojaöllipide und Lecithin genannt. Die oben erwähnten Amin-N-oxide können auch in polymerer Form vorliegen, wobei ein Verhältnis Amin- zu Amin-N-oxid von 10: 1 bis 1: 1 000 000 vorliegen muß. Die mittlere Molmasse beträgt 500 bis 1 000 000, besonders bevorzugt jedoch 5 000 bis 100 000.

m) Weitere Komponenten: Weitere Komponenten können in die Wasch-, Reinigungs- oder Körperpflegemittelformulierungen eingebaut werden: Weitere Träger, Hydrotropica, Prozesshilfsmittel, Farbstoffe oder Pigmente, Parfums, Lösungsmittel für Flüssigformulierungen (besonders bevorzugt sind Alkohole mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 Hydroxygruppen), feste Füller für Stückseifenformulierungen, Perlglanzmittel, z. B. Distearoylglyceride, Konservierungsmittel, Pufferungssysteme und so weiter. Sollte ein höheres Schäumvermögen der Formulierung, wie z. B. in einigen Körperpflegemitteln, erforderlich sein, so kann dieses z. B. durch den Zusatz von C_{10} - C_{16} -Alkanolamiden (in Konzentrationen von 1 bis 10 % der Gesamtformulierung) erhöht werden. Auch weitere wasserlösliche Magnesiumsalze können

zur Erhöhung des Schäumvermögens und der Fettlösekraft in Mengen von 0,1 bis 2 % zugesetzt werden.

Wenn notwendig, können einige der obengenannten Tensidkomponenten auch durch Adsorption auf poröse hydrophobe Substanzen stabilisiert und mit einer weiteren hydrophoben Schicht versiegelt in die Formulierung eingearbeitet werden.

Verwendung: Die erfindungsgemäßen Formulierungen können sehr vielseitig verwendet werden wie z. B. als Hautreiniger, Badezusatz, Duschbad, Gebißreiniger, Haarwasch- und -pflegemittel, Rasierseife, Pre-shaving, Desinfektionsmittel, Dispergiermittel, Universalwaschmittel und Feinwaschmittel, sowohl in flüssiger Form als auch als Pulver oder Granulat, für Textilien, Hand- und Maschinengeschirrspülmittel, Haushaltsreiniger und Industriereiniger.

15

20

25 -

30

10

5

Beispiele

Die folgenden Beispiele, die keinen die Ansprüche einschränkenden Charakter haben sollen, zeigen die positiven anwendungstechnischen Eigenschaften der Geminitenside gemäß Formel (I), die sie für den Einsatz in den o.g. Verwendungszwecken prädestinieren.

A) Reinigung von harten Oberflächen

Zur Bestimmung der Reinigungswirkung an harten Oberflächen wurden je 7 Trägerstreifen aus Hart-PVC (455 x 39 x 2,5 mm) eng nebeneinander gelegt und auf einer Seite der Trägerstreifen eine weiße PVC-Folie (400 x 400 mm) blasenfrei aufgelegt. Anschließend wurden Schablonen aus PVC (300 x 350 x 3 mm) mit 260 x 280 mm-Ausschnitt so auf die Folie plaziert, daß der Ausschnitt über der Mitte der Folie lag. Innerhalb des Ausschnittes wurden 2 g eines Testschmutzes (7 Gew.-% Spezialschwarz 4, Fa. Degussa, 17 Gew.-% Myritol 318, Fa. Henkel, 40 Gew.-% Prozeßöl 310, Fa. Esso, 36 Gew.-% Exxon DSP 80/100, Fa. Exxon) mittels eines Flachpinsels auf der Folie verteilt. Die Trägerstreifen wurden mit einem Messer getrennt. Je ein Teststreifen wurde dann in die Metallführungsschiene eines Dardner-

10

25

30

Waschbarkeits- und Scheuerprüfgerätes (Modell M-105-A, Fa. Erichsen) gelegt und mit einem feuchten Schwamm, der in einem Schlitten plaziert war, mit 16 ml der zu untersuchenden tensidhaltigen Formulierung (Tensidgehalt: 1 Gew.-%) gereinigt. Dies geschah durch 10 maliges Hin- und Herbewegen des Schlittens. Nach dem Trocknen der Teststreifen wurde die PVC-Folie vom Trägerstreifen gelöst und mit der gereinigten Seite nach oben auf weiße Pappe geklebt. Die Reinigungsleistung der jeweiligen tensidhaltigen Formulierung wurde spektralphotometrisch mit Hilfe eines Spektralphotometers "datacolor 3890" bei einer Wellenlänge von 560 nm relativ zu einem Weißstandard (= 100 %) und einem angeschmutzten Standard (= 0 %) bestimmt.

(Vergleichsbeispiel):

Als Standardformulierung wurde die Reinigungsleistung eines marktgängigen Allzweckreinigers mit 65 % bestimmt.

Erfindungsgemäße Beispiele:

20 Die Reinigungsleistungen der erfindungsgemäßen anionischen Geminitenside wurden anhand der folgenden Rezeptur bestimmt:

anionisches Geminitensid: 3,0 Gew.-%
Marlipal 0 13/80*: 1,0 Gew.-%
Kokosfettsäure-Na-salz: 0,25 Gew.-%

*) C₁₃-Alkohol mit 8 Ethylenoxideinheiten (Fa. Hüls)

Folgende anionische Geminitenside wurden untersucht:

1: Gemäß Formel (I), mit $R^1 = R^3 = C_7 - C_9 - Alkyl$, $R^2 = C_6 H_{12}$, $X = Y = (C_2 H_4 O)_{a,b}, SO_3 Na$, a + b = 8, z = 1;

2: Gemäß Formel (I), mit
$$R^1 = R^3 = C_7 - C_9 - Alkyl$$
, $R^2 = C_6 H_{12}$, $X = Y = (C_2 H_4 O)_{a,b}$, $SO_3 Na$, $a + b = 20$, $z = 1$;

3. Gemäß Formel (I), mit
$$R^1 = R^3 = C_7 - C_9 - Alkyl$$
, $R^2 = C_2 H_4$, $X = Y = (C_2 H_4 O)_{a,b}$, $SO_3 Na$, $a + b = 16$, $z = 1$;

Beispiel 1:

5

10

15

20

25

30

35

Die Reinigungsleistung der Verbindung 1 enthaltenden Rezeptur wurde mit 72 % bestimmt und ist somit höher als die im Vergleichsbeispiel genannte.

Beispiel 2:

Die Reinigungsleistung der Verbindung 2 enthaltenden Rezeptur wurde mit 74 % bestimmt und ist damit höher als die im Vergleichsbeispiel genannte.

Beispiel 3:

Die Reinigungsleistung der Verbindung 3 enthaltenden Rezeptur wurde mit 66 % bestimmt und ist damit höher als die im Vergleichsbeispiel genannte.

B) <u>Waschvermögen von Textilien</u>

Zur Bestimmung des Waschvermögens von Textilien wurde die Waschtrommel einer marktgängigen Haushaltswaschmaschine mit 4 kg (für 95 °C und 60 °C-Wäsche) bzw. mit 1 kg (für 30 °C-Wäsche) sauberem Baumwoll-Ballastgewebe von der Fa. Carl Laarmann (Art.-Nr. 5005 HE) beschickt. Weiterhin wurden mit Hautfett-Pigment-Anschmutzung behandelte Prüfläppchen der WFK-Testgewebe GmbH mit der testverschmutzten Seite nach oben auf ein weißes Baumwollhandtuch (Fa. Carl Laarmann, Art.-Nr.: HL DIN G 25) aufgenäht. Das so präparierte Baumwollhandtuch wurde in die Trommel der Haushaltswaschmachine zum Ballastgewebe gegeben. Folgende WFK-Testgewebe wurden verwendet:

Baumwolle (BW). 10 D
Baumwoll-Polyester.Mischgewebe (MG): 20 D
Polyester (PE): 30 D

Die Waschvermögen der erfindungsgemäßen anionischen Geminitenside wurden anhand der folgenden Rezeptur eines flüssigen Vollwaschmittels bestimmt:

	Anionisches Geminitensid	13,0 Gew%
5	MARLIPAL 24/70 ^{*1}	15,5 Gew%
	КОН, 50 %ig	3,9 Gew%
	Kokosfettsäure	10,0 Gew%
	Triethanolamin	5,0 Gew%
	1,2-Propylenglykol	3,0 Gew%
10	Ethanol	8,0 Gew%
	Dequest 2060 S ^{*2}	1,5 Gew%
	Rest zu 100 GewWasser	

- *1 $C_{12/14}$ -Alkohol mit 7 Ethylenoxideinheiten (Fa. Hüls)
- *2 Diethylentriamin-penta-(meth.phosph.säure) (Fa. Monsanto)

Die Einsatzmenge des flüssigen Vollwaschmittels betrug jeweils 25 g pro Waschgang. Nach erfolgter Wäsche wurden die WFK-Testgewebe getrocknet. Die Bestimmung des Waschvermögens erfolgte spektralphotometrisch durch Ermittlung der Remission mit Hilfe des Spektralphotometers datacolor 3890 (Weißstandard: 100 % Remission, testangeschmutztes Gewebe: 0 % Remission).

25 Folgende anionische Geminitenside wurde untersucht:

4: Gemäß Formel (I), mit
$$R^{1}=R^{3}=C_{7}-C_{9}-Alkyl, R^{2}=C_{4}H_{8}, X=Y=(C_{2}H_{4}O)_{a,b}(SO_{3}Na)_{1,16},$$
 a+b=17,3, z=1;

5: Gemäß Formel (I), mit
$$R^{1}=R^{3}=C_{11}-C_{13}-Alkyl, R^{2}=C_{6}H_{12}, X=Y=(C_{2}H_{4}O)_{a,b}(SO_{3}Na)_{1,65},$$
 a+b=17,9, z=1;

Um die Waschvermögen besser beurteilen zu können, wurde anstelle der Geminitenside im Vergleichsbeispiel das üblicherweise verwendete MARLON PS (sek.-Alkansulfonat-Na-salz), Hüls AG) in der gleichen Konzentration in die o.g. Rezeptur eingesetzt.

5 Gefundene Remissionswerte in %:

	In der Rezeptur verwendetes	PE	MG	MG		BW BW
	Tensid	30 °C	30 °C	60 °C	60 °C	95 °C
10	sek. Alkansulfonat-Na-salz		7 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46			
	(nicht erfindungsgemäß)	49	44	30	24	25
	4	58	44	30	30	31
	5	52	48	33	30	40

Es zeigt sich, daß 4 und 5 gleiche bzw. wesentlich bessere Remissionswerte bewirken als das sek.-Alkansulfonat-Na-Salz.

Patentansprüche:

 Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I als Bestandteil von Wasch-, Reinigungs- und Körperpflege mitteln

 $O = \begin{pmatrix} R^1 & (I), \\ N-X & \\ R^2 & \\ O = \begin{pmatrix} R^3 & \\ R^3 & \\ \end{pmatrix}$

10

5

wobei in der Formel I R¹ und R³ unabhängig voneinander einen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen, R² einen Spacer, der 0 bis 100 Alkoxygruppen enthält,

und X oder Y einen Substituenten der Formel II

 $-(C_2H_40)_{\alpha}(C_3H_60)_{\beta}H$ (II)

20 mit $\alpha = 0$ bis 50,

 β = 0 bis 60

und $\alpha + \beta = 1$ bis 100,

und X oder Y einen Substituenten der Formel III

25 oder

30

35

X und Y unabhängig voneinander Substituenten der Formel III

 $-(C_2H_4O)_{\gamma}(C_3H_6O)_{\delta}FR \tag{III),$

wobei FR für einen funktionellen Rest - CH_2 -COOM, - SO_3M , - $P(0)(OM)_2$, - $O-C(0)-C_2H_3$)- CO_2M' oder - C_2H_4 - SO_3M mit M, M'=Alkali-, Ammonium-,

Alkanolammonium- oder 1/2 Erdalkaliion steht.

mit y = 0 bis 20,

 $\delta = 0$ bis 20

und $\gamma + \delta = 1$ bis 40 ,

und wobei die Alkoxideinheiten bei den Verbindungen gemäß den Formeln II und III statistisch oder blockweise eingebunden sind und die Reihenfolge beliebig ist,

20

bedeutet, und wobei der Substitutionsgrad Z = 1 bis 10 beträgt.

- Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet,
 daß die Kohlenwasserstoffreste R¹ und R³ unabhängig voneinander für einen unverzweigten oder verzweigten, gesättigten oder ungesättigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen stehen, R² einen Spacer, bestehend aus einer unverzweigten oder verzweigten Kette mit 2 bis 100 Kohlenstoffatomen, die 0 bis 20 Sauerstoff-, 0 bis 20 Stickstoff-, 0 bis 4 Schwefel- und/oder 0 bis 3 Phosphoratome enthält und die 0 bis 20 Hydroxyl-, Car-bonyl-, Carboxyl-, Amino- und/oder Acylaminogruppen enthält, bedeutet.
 - 3. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Geminitenside bei gleicher Grundstruktur eine Mischung von Homologen mit verschieden langen lipophilen Kohlenwasserstoffresten sind.
 - 4. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Geminitenside bei gleicher Grundstruktur eine Mischung von No.
- daß die Geminitenside bei gleicher Grundstruktur eine Mischung von Homologen mit verschieden langen Spacern \mathbb{R}^2 sind.
- Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Geminitenside bei gleicher Grundstruktur eine Mischung von Homologen mit verschieden langen Alkoxyketten im Spacer R² und/oder in den funktionellen Gruppen X und Y sind.
- Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,

15

25

30

35

dadurch gekennzeichnet,

daß weitere anionische, nichtionische, kationische, betainische und/oder amphotere grenzflächenaktive Verbindungen enthalten sind.

 Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß als nichtionische grenzflächenaktive Verbindungen Fettsäureglyceride, Fettsäurepolyglyceride, Fettsäureester, Alkoxylate von C_6 - C_{30} - Alkoholen, alkoxylierte Fettsäureglyceride, Polyoxyethylenoxypropylenglykolfettsäureester, Polyoxyethylensorbitanfettsäureester, Polyoxyethylen-Rhizinusöl- oder gehärtete Rhizinusölderivate, Polyoxyethylenlanolinderivate, Polyoxyethylenfettsäureamide, Polyoxyethylenalkylamine, Derivate von Alkanolaminen, Derivate von Alkylaminen, Alkylaminoxide, Derivate von Eiweißhydrolysaten, Hydroxymischether, Alkylpolyglycoside, Alkylglucamide, nichtionische Geminitenside und nichtionische verbrückte Tenside und deren Mischungen eingesetzt werden.

20 8. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche.

dadurch gekennzeichnet,

- daß als anionische grenzflächenaktive Verbindungen Seifen, Ethercarbonsäuren und deren Salze, Alkylsulfonate, α -Olefinsulfonate, α -Sulfofettsäurederivate, Sulfonate höherer Fettsäureester, höhere primäre und sekundäre Alkoholsulfate, Alkoholethersulfate, Hydroxymischethersulfate, Sulfate von alkoxylierten Carbonsäurealkanolamiden, Salze von Phosphatestern, Tauride, Isethionate, lineare Alkylbenzolsulfonate, verbrückte Alkylbenzolsulfonate, Alkylarylsulfonate, Sulfate Polyoxyethylenfettsäureamide und Derivate von Acylaminosäuren. Alkylethercarbonsäuren, Alkyl- und Dialkylsulfosuccinate, Alkyl- oder Alkenylsarcosinate und sulfatierte Glycerinalkylether und deren Mischungen eingesetzt werden.
 - 9. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,

10

15

20

25

dadurch gekennzeichnet,

daß als kationische grenzflächenaktive Verbindungen Alkyltrimethylammoniumsalze, Dialkyldimethylammoniumsalze, Alkyldimethylbenzylammoniumsalze, Imidazoliniumderivate, Alkylpyridiniumsalze, quaternierte Fettsäureester von Alkanolaminen, Alkylisochinoliniumsalze, Benzethoniumchloride und kationische Acylaminosäurederivate eingesetzt werden.

10. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

daß als grenzflächenaktive Betaine und Ampholyte Kokosacylamidopropylbetain, Acylamidopentandiethylbetain, Dimethylammoniohexanoatacylamidopropan-(oder -ethan-)dimethyl (oder -diethyl-)betain mit C-Kettenlängen von 10 bis 18 C-Atomen, Sulfobetaine, Imidazolinderivate, Sojaöllipide und Lecithin und deren Mischungen eingesetzt werden.

- 11. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche in Formulierungen zum Reinigen von Textilien.
- 12. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche in Formulierungen zum Reinigen von harten Oberflächen.
- 13. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche in Formulierungen zum manuellen Spülen.
- 30 14. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche in Formulierungen zum Reinigen von Haut und Haar.
- 15. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der allgemeinen Formel I gemäß mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche als Bestandteil von Körperpflegemitteln.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interne al Application No PCT/EP 97/01298

	SISTEMBER :						.,
IPC 6	SIFICATION OF SUBJECT M C11D1/28 C	11D1/10	C11D1/34		A61K7/50)	
According	to International Patent Classific	ston (IPC) or to	hoth national classific	cation and	1 IPC		
1	S SEARCHED	(11 0) 01 10	CONTRACTOR CIAMINA	CAGOII AII	3 II C		
	documentation searched (classi	fication surtem foll	ound by danification		_1		
IPC 6	C11D A61K	meadon system for	owed by classification	n symou	5)		
Document	ation searched other than minim	um documentation	to the extent that suc	ch docum	ents are inclu	ded in the fields	searched
Electronic	data base consulted during the i	nternational search	(name of data base a	and, when	re practical, so	arch terms used	
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE	RELEVANT				·	
Category *	Citation of document, with in		nmorriste of the rela-	unnt nass			
		-	propriate, or the refer	vant pass			Relevant to claim No.
X,P, L	DE 44 40 328 A 15 May 1996				-		1,2
Y,P	see claims 1,2						1,2,6-15
Y	WO 95 19955 A 1995			7 Jul	у		1,2,6-15
	cited in the a see claims 1-7	pplication; example:	า ร				
			-				
							·
		•					
Furt	er documents are listed in the o	ontinuation of box	c. X	Pate	nt family men	nbers are listed i	n annex.
* Special cat	egories of cited documents :			later doe	nament auchtich	ad a Dan ab	
conside	nt defining the general state of t red to be of particular relevance	•	`	cited to	ity date and no understand the	n conflict wit	mational filing date h the application but cory underlying the
ming o			.х.	document cannot b	t of particular	relevance; the o	claimed invention be considered to
citation	nt which may throw doubts on p s cited to establish the publication or other special reason (as spec	on date of another ified)	'Y'	documen	an inventive st it of particular	cp when the doc relevance; the o	current is taken alone
Ortisa tit	nt referring to an oral disclosure eans at published prior to the internat			aucumer	n is combined ach combined	with one or mo	rentive step when the re other such docu- s to a person skilled
IACCI UN	ar the priority date claimed		1t			he same patent i	amily
	August 1997	onal search		Date of n		nternational sea	rch report
	ailing address of the ISA			Authorize	d officer		
	European Patent Office, P.B. NL · 2280 HV Ripwijk				- venitti		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fac: (+31-70) 340-3016 Loiselet-Taisne,						;

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Intern al Application No

	cormation on patent family mem	PCT/EP 97/01298		
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
DE 4440328 A	15-05-96	AU 3567895 WO 9614926	A	06-06-96 23-05-96
WO 9519955 A	27-07-95	NONE	****	*******************************
				, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
•				
		•		
	\			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen
PCT/EP 97/01298

F						1 4 1 / 2 1	7.701250
IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANM C11D1/28	C11D1/10	C11D1/	34	A61K7/	50	
Nach der i	nternationalen Patentklassaf	ikation (IPK) oder nac	h der nationaler	Klassifik	ation und der [PK	
	ERCHIERTE GEBIETE						
IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klas C11D A61K		·				
	rte aber meht zum Mindest : er internationalen Recherch						
C. ALEW							
	ESENTLICH ANGESEHE						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffer	ntlichung, soweit erford	kerlich unter An	gabe der ii	Betracht komr	menden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X,P, L	15.Mai 1996	B A (HUELS C			AG)		1,2
Y,P	siehe Anspri Beispiele	üche 1,2,11,	13,14,17-	-19;			1,2,6-15
Y	! 1995 in der Anmel	A (PROCTER and a liche 1-7; Be	t	27.J	uli		1,2,6-15
Weite entne	rre Veröffentlichungen zind hmen	der Fortsetzung von F	eld C zu	X	Siche Anhang f	Patentfamilie	
"A" Veröffer aber me "E" älteres E Anmeld "L" Veröffer	Kategorien von angegebene ntlichung, die den allgemeir cht als besonders bedeutsam Oolsument, das jedoch erst a dedatum veröffentlicht word ntlichung, die geergnet ist, e	nen Stand der Technik nanzusehen ist im oder nach dem inter en ist inen Prioritätsanspruch	mationalen zweifelhaft er-	Ann Erfir Theo	eldung nicht ko dung zugrundel nic angegeben i ffentlichting vor	iaum verottentici illidiert, sondem n liegenden Prinzips ist n besonderer Bede	n internationalen Anmeidedatum M worden ist und mit der ur zumVerständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindung ichung nicht als neu oder auf
anderen soll ode ausgefü 'O' Veröffer eine Ber 'P' Veröffen	in zu lassen, oder durch die o im Recherchenbericht gen er die aus einem anderen be- hrt) ntlichung, die sich auf eine i nutzung, eine Ausstellung o atlichung, die vor dem inter	das Verollentlichungs annten Veröffentlichun sonderen Grund angeg mündliche Offenbarun der andere Maßnahme nationalen Anmeldeda	laturn einer g belegt werden eben ist (wie g n bezieht	"Y" Verö kann werd Verö diese	fentlichung von nicht als auf er m, wenn die Ve ffentlichungen d Verbindung für	teit berühend betra n besonderer Bede finderischer Tätig cröffentlichung mi dieser Kategone in r einen Fachmann	ichtet werden utung; die beanspruchte Erfindung ket beruhend betrachtet tener oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nabeliegend ist
gem bei	anspruchten Prioritatsdatum	veröffentlicht worden	ist	& Vero	tentlichung, die	Mitglied derselbe	n Patentfamilie ist
	.August 1997	en Re cherche		Abse		4. 09. 97	cherchenberichts
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·· UJ. 3/	
ivaine und Po	ostanschrift der Internationa Europäisches Patentamt, NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	P.B. 5818 Patentiaan	2	Bevo	lmächtigter Bed Loiselet	aicnsteter	,
				ł			- I

· 2

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichunge..., die zur selben Patentfamilie gehören

Interne idex Aktenzeichen
PCT/EP 97/01298

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
DE 4440328 A	15-05-96	AU 3567895 A WO 9614926 A	06-06-96 23-05-96	
WO 9519955 A	27-07-95	KEINE		

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)